

SEGUNDO PARCIAL – SÁBADO 5 DE DICIEMBRE DE 2020

Nro de Parcial	Cédula	Apellido y nombre

(I) Múltiple opción. Total: 40 puntos

Puntajes: 8 puntos si la respuesta es correcta, 0 punto por no contestar y -1.5 si la respuesta es incorrecta.

Indique sus respuestas en los casilleros correspondientes, con letras mayúsculas imprenta: A, B, C, D o E.


Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5
D	D	B	C	C

Ejercicio 1

Sea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / |y| > x^2, -4 < y < 1\}$. Entonces $\iint_D (3 - 6xy) dx dy$ vale

- A) 8
- B) 16
- C) 22
- D) 36
- E) 48

Solución: Observar que la región D es la siguiente:



De donde se ve claramente que si $0 \leq y < 1$ entonces $-\sqrt{y} < x < \sqrt{y}$ y si $-4 < y < 0$ entonces $-\sqrt{-y} < x < \sqrt{-y}$. Por lo que

$$\begin{aligned}
 \iint_D (3 - 6xy) dx dy &= \int_{-4}^0 \int_{-\sqrt{-y}}^{\sqrt{-y}} (3 - 6xy) dx dy + \int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} (3 - 6xy) dx dy \\
 &= \int_{-4}^0 (3x - 3x^2 y) \Big|_{-\sqrt{-y}}^{\sqrt{-y}} dy + \int_0^1 (3x - 3x^2 y) \Big|_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dy \\
 &= \int_{-4}^0 6\sqrt{-y} dy + \int_0^1 6\sqrt{y} dy \\
 &= \int_0^4 6\sqrt{y} dy + 4y^{3/2} \Big|_0^1 = 4y^{3/2} \Big|_0^4 + 4 \\
 &= 32 + 4 = 36
 \end{aligned}$$

Respuesta: **D**.

Ejercicio 2

Sean f y g las dos funciones de \mathbb{R}^2 a \mathbb{R} definidas como sigue:

$$f(x, y) = \frac{x^4 - y^4 + x^6}{(x^2 + y^2)^2} \quad g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^3 - y^3} & \text{si } x \neq y \\ 0 & \text{si } x = y \end{cases}$$

Considere los límites $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$, y $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y)$. Entonces:

- A) Ambos límites existen y son 0.
- B) El límite de $f(x, y)$ existe y es 0, pero el límite de $g(x, y)$ no existe.
- C) El límite de $g(x, y)$ existe y es 0, pero el límite de $f(x, y)$ no existe.
- D) No existen ninguno de los dos límites.
- E) Ambos límites existen, pero no son 0.

Solución:

Empecemos con el límite de f .

Observar que si $x \neq 0$ entonces $f(x, 0) = 1 + x^2$ y si $y \neq 0$ tenemos $f(0, y) = -1$. Por lo tanto,

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ no existe, ya que en cada eje el límite da distinto.

Veamos ahora que pasa para g .

Si nos consideramos la curva $y = x + x^2$, tenemos que $g(x, x + x^2) = \frac{x^4 + 2x^5 + x^6}{-3x^4 - 3x^5 - x^6}$, por lo tanto si nos consideramos el límite de g a lo largo de esa curva con x tendiendo a 0, tenemos que g tiende a $-1/3$.

Por otra parte, $g(x, x) = 0$ por lo que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y)$ no existe.

Respuesta: **D**.

Ejercicio 3

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función que cumple:

$$f(x, x^2) = 1, \quad \forall x \neq 0, \quad f(x, 0) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad f(0, y) = 0, \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

Seleccione la opción correcta.

- A) f no es continua en $(0, 0)$ y en consecuencia no existe ninguna derivada direccional en $(0, 0)$
- B) Las derivadas parciales de f en $(0, 0)$ existen pero f no es diferenciable.
- C) Se verifican las hipótesis de la condición suficiente de diferenciability, luego f es diferenciable
- D) f es diferenciable, aunque no se verifica la condición suficiente de diferenciability.
- E) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Solución:

Observar que de las condiciones que cumple f , obtenemos que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$. Por lo tanto, f no es continua en $(0, 0)$ y por ende, tampoco diferenciable.

La condición $f(x, 0) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$ implica que $f_x(0, 0) = 0$ y análogamente $f(0, y) = 0, \forall y \in \mathbb{R}$ implica que $f_y(0, 0)$. Por lo que ambas derivadas parciales existen en $(0, 0)$.

Respuesta: **B**.

Ejercicio 4

Hallar la integral de la función $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$ en el conjunto

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq 1, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 2x\}.$$

- A) $\frac{8}{3}$
- B) $\frac{2\pi}{3}$
- C) $\frac{16}{9}$
- D) $\frac{9}{2}$
- E) 8

Solución:

Bien, observar que la ecuación $x^2 + y^2 = 2x$ es la ecuación de la circunferencia de radio 1 y centro $(1, 0)$. Además la intersección entre esta circunferencia y una recta que pasa por el origen ($y = mx$) es el conjunto $\left\{ (0, 0), \left(\frac{2}{1+m^2}, \frac{2m}{1+m^2} \right) \right\}$.

Por lo tanto, si consideramos coordenadas cilíndricas, tenemos que la preimagen de D es el conjunto $\{(\rho, \theta, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2, 0 \leq \rho \leq 2\cos(\theta)\}$.

Entonces,

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \int_0^1 \int_0^{\pi/2} \int_0^{2\cos(\theta)} \rho^2 d\rho d\theta dz = \frac{8}{3} \int_0^1 \int_0^{\pi/2} \cos^3(\theta) d\theta dz = \frac{16}{9} \int_0^1 dz = \frac{16}{9}$$

Respuesta: **C**.

Ejercicio 5

Sean $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dos funciones diferenciables. Se sabe que $f(x, y) = \left(\frac{x}{2} + \frac{y^2}{4} - x^3 + \frac{3}{4}, xy + \frac{y^4}{2} \right)$, y que:

$$J_g(1, \frac{1}{2}) = \begin{pmatrix} 2 & \pi \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad J_g(0, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ e & 2 \end{pmatrix}.$$

Sea $h = g \circ f$. Entonces la matriz Jacobiana de h en el punto $(0, 1)$ es:

- A) $J_h(0, 1) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$
- B) $J_h(0, 1) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{\pi}{2} + 3 \\ 2 & \frac{\pi}{2} - 3 \end{pmatrix}$
- C) $J_h(0, 1) = \begin{pmatrix} 1 + \pi & 1 + 2\pi \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$
- D) $J_h(0, 1) = \begin{pmatrix} \frac{1+e}{2} & 1 \\ 1 + 2e & 4 \end{pmatrix}$
- E) $J_h(0, 1) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{e}{2} + 2 & \frac{e}{2} + 4 \end{pmatrix}$

Solución:

Primero que nada recordar que si $h = g \circ f$ entonces $J_h(1, 0) = J_g(f(1, 0))J_f(1, 0)$. Observar que $f(1, 0) = (1, 1/2)$ y falta hallar $J_f(1, 0)$.

Es fácil ver que

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) &= \frac{1}{2} - 3x & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y) &= \frac{1}{2}y \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) &= y & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y) &= x + 2y \end{aligned}$$

Por lo que $J_f(1,0) = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ y por tanto

$$J_h(1,0) = J_g(1,1/2)J_f(1,0) = \begin{pmatrix} 2 & \pi \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + \pi & 1 + 2\pi \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Respuesta: **C**.

(II) Desarrollo. Total: 20 puntos. Justifique sus respuestas.

Problema 1

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Definir continuidad de f en un punto.

Solución: Una función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en un punto a sii $\forall \varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $f(B(a, \delta)) \subset B(f(a), \varepsilon)$.

2. Definir diferenciabilidad de f en un punto.

Solución: f es diferenciable en (a, b) sii existen dos reales A, B tales que

$$f(a + \Delta x, b + \Delta y) = f(a, b) + A\Delta x + B\Delta y + r(\Delta x, \Delta y)$$

con $r : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función que cumple $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{r(\Delta x, \Delta y)}{\|(\Delta x, \Delta y)\|} = 0$.

3. Definir derivadas parciales y direccionales de f en un punto.

Solución: Se defina la derivada direccional de f respecto al vector dirección v en el punto a como el siguiente límite, si existe:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + hv) - f(a)}{h}$$

Las derivadas parciales son las derivadas direccionales según las direcciones $(1, 0)$ y $(0, 1)$.

Demostrar que si f es diferenciable en el punto (a, b) , entonces:

4. f es continua en (a, b) .

Solución: Si f es diferenciable en (a, b) entonces existen dos reales A, B tales que

$$f(a + \Delta x, b + \Delta y) = f(a, b) + A\Delta x + B\Delta y + r(\Delta x, \Delta y)$$

por lo tanto, si tomamos límite con $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$, tenemos

$$\begin{aligned} \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} f(a + \Delta x, b + \Delta y) &= \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} f(a, b) + A\Delta x + B\Delta y + r(\Delta x, \Delta y) \\ &= f(a, b) + \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} A\Delta x + B\Delta y + r(\Delta x, \Delta y) \\ &= f(a, b) \end{aligned}$$

por lo que f es continua en (a, b) .

5. Existen las derivadas parciales de f en (a, b) .

Solución: Si planteamos la definición de derivada parcial tenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{Ah + r(h, 0)}{h} \\ &= A + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h, 0)}{h} \\ &= A \end{aligned}$$

Problema 2

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x, y) = \begin{cases} xy \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

1. Estudiar la continuidad de f en el origen.

Solución: Para estudiar la continuidad en el origen, nos conviene pasar a polares, así tenemos que estudiar el siguiente límite

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \cos(\theta) \operatorname{sen}(\theta) \rho^2 \operatorname{sen}(1/\rho^2)$$

pero observar que $1 \leq \cos(\theta) \operatorname{sen}(\theta) \leq 1$ por lo tanto como $\rho^2 \operatorname{sen}(1/\rho^2)$ tiende a cero (por ser $\operatorname{sen}(1/\rho^2)$ acotado), tenemos que el límite anterior es cero. Por lo tanto, f es continua en el origen.

2. Estudiar las derivadas parciales de f en el orgien.

Solución Observar que $f(x, 0) = 0 = f(0, y)$, por lo tanto las derivadas parciales existen en el origen y son nulas.

3. Estudiar la diferenciabilidad de f en el origen.

Solución: Pasando a polares se puede ver que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$. Por lo tanto, por ser $\operatorname{sen}\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)$ acotado, tenemos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right) = 0,$$

es decir f es diferenciable en el origen. Basta tomar $A = 0 = B$ y $r(x, y) = xy \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)$

4. Estudiar si las derivadas parciales son continuas en el origen.

Solución: Veamos que las derivadas parciales no son continuas en $(0, 0)$. Observar que como la formula de f es simétrica, basta probarlo para una sola, por ejemplo f_x .

Si $(x, y) \neq (0, 0)$ tenemos

$$f_x(x, y) = y \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right) - \frac{2x^2y}{(x^2+y^2)^2} \cos\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right).$$

Observar que si nos movemos por la recta $x = y$, tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0} f_x(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{2x^2}\right) - \frac{2x^3}{x^4} \cos\left(\frac{1}{2x^2}\right) = \pm\infty,$$

por lo tanto la derivada parcial f_x no es continua en $(0, 0)$.