

Práctico 6: Distribución conjunta. Variables independientes.

Ejercicio 1

Se considera un grupo de 9 personas de las cuales hay 2 que son contadores y 3 que son abogados. Se eligen al azar 5 personas de ese grupo de 9. Se definen: X = Cantidad de contadores en las 5 personas elegidas e Y = Cantidad de abogados en las 5 personas elegidas

1. ¿Qué valores pueden tomar las variables aleatorias X e Y ?
2. Construir la función de probabilidad (puntual) conjunta de X e Y .
3. A partir de b), halle las funciones de probabilidad (puntual) marginales de X e Y .
4. Calcular $P\{X = Y\}$
5. ¿Son X e Y variables aleatorias independientes?

Ejercicio 2

Se consideran dos variables aleatorias: X , que toma los valores -1 y 1 e Y que toma los valores 2, 4 y 6 con las probabilidades conjuntas dadas por la siguiente tabla:

X/Y	2	4	6
-1	0,2	0,25	0,15
1	0,1	a	0,25

1. Hallar a
2. Calcular $P\{X < 1, Y = 4\}$
3. Hallar las funciones de probabilidad de $X + 2Y$, $X + Y$, y $|X - Y|$.

Ejercicio 3

Se consideran dos variables aleatorias X e Y , que toman los valores 1, 2 y 3 cada una con las probabilidades conjuntas dadas en la siguiente tabla:

X/Y	1	2	3
1	0,02	0,08	c
2	a	0,08	0,1
3	0,06	b	0,3

1. Hallar a , b y c sabiendo que X e Y son independientes.
2. Calcular las funciones de probabilidad marginales.

Ejercicio 4

Se consideran dos variables aleatorias: X , que toma los valores -1 y 2, e Y que toma los valores 0, 1 y 2 con las probabilidades conjuntas dadas en la siguiente tabla:

X/Y	0	1	2
-1	0,4	0,2	0,1
2	0,05	a	0,15

1. Hallar a .
2. Hallar las funciones de probabilidad marginales de X e Y .
3. Hallar la función de probabilidad conjunta de $U = X + Y$ y $V = X - Y$

- Hallar las funciones de probabilidad marginales de U y V
- ¿Son X e Y independientes?
- ¿Son U y V independientes?

Ejercicio 5

- Sean X e Y dos variables aleatorias cuya distribución conjunta es

$$F_{XY}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 1, y \geq 1 \\ y & \text{si } y \in [0, 1), x \geq y \\ x & \text{si } x \in [0, 1), y \geq x \\ 0 & \text{en los otros casos} \end{cases}$$

Hallar la distribuciones marginales F_X y F_Y .

- Sean X e Y dos variables aleatorias cuya distribución conjunta es

$$F_{XY}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 1, y \geq 1 \\ y & \text{si } x \geq 1, y \in [0, 1) \\ x & \text{si } x \in [0, 1), y \geq 1 \\ xy & \text{si } x \in [0, 1), y \in [0, 1) \\ 0 & \text{en los otros casos} \end{cases}$$

Hallar la distribución (marginal) F_X y la distribución (marginal) F_Y .

- Si X e Y son variables aleatorias, ¿las distribuciones marginales F_X y F_Y determinan la distribución conjunta F_{XY} ? ¿En qué caso F_X y F_Y determinan la distribución conjunta?

Ejercicio 6

Se considera la siguiente función $p_{XY} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$p_{XY}(x, y) = \begin{cases} k(2x + y) & \text{si } x \in R_X = \{0, 1, 2, 3\}, y \in R_Y = \{1, 2, 3\} \\ 0 & \text{en los otros casos} \end{cases}$$

- Hallar k para que p_{XY} sea función de probabilidad puntual conjunta.
- Sean X e Y variables aleatorias discretas con $R_X = \{0, 1, 2, 3\}$ y $R_Y = \{1, 2, 3\}$, cuya función de probabilidad puntual conjunta es p_{XY} . Hallar las funciones de probabilidad puntuales (marginales) p_X y p_Y .
- ¿ X e Y son independientes? Justifique la respuesta.
- Calcular $\mathbf{P}\{1 \leq X < 3, 2 < Y \leq 3\}$ y $\mathbf{P}\{X + Y < 3\}$.

Ejercicio 7

Se considera la siguiente función $f_{XY} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} kxy & \text{si } x \in (0, 4) \quad y \in (1, 5) \\ 0 & \text{en los otros casos} \end{cases}$$

- Hallar k para que f_{XY} sea la función de densidad conjunta de dos variables aleatorias X, Y absolutamente continuas.
- Hallar las densidades (marginales) f_X y f_Y .
- Hallar la distribución conjunta F_{XY} y la distribuciones (marginales) F_X y F_Y .
- ¿ X e Y son independientes? Justifique la respuesta.
- Calcular $\mathbf{P}\{X \geq 3, Y \leq 2\}$ y $\mathbf{P}\{X + Y > 4\}$.

Ejercicio 8

Sean X_1, X_2, \dots, X_n iid con distribución F .

1. Calcular la función de distribución de $X_n^* = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.
2. Calcular la función de distribución de $X_1^* = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

Ejercicio 9

1. Sean X e Y dos variables aleatorias independientes con distribución exponencial de parámetros μ y λ respectivamente. Hallar la distribución de la variable aleatoria $Z = \min\{X, Y\}$.
2. Para las variables de la parte anterior. Calcular $P\{X < Y\}$ en función de μ y λ .
3. Un sistema electrónico con dos componentes A y B puede ser afectado por tres tipos de shock eléctrico.
 - a) Uno que sólo destruye a A y que se produce (partiendo de un instante inicial) en un tiempo X_1 que tiene distribución exponencial de parámetro λ_1 .
 - b) Uno que sólo destruye a B y que se produce (partiendo de un instante inicial) en un tiempo X_2 que tiene distribución exponencial de parámetro λ_2 .
 - c) Uno que destruye a ambos componentes y que se produce (partiendo de un instante inicial) en un tiempo X_3 que tiene distribución exponencial de parámetro λ_3 .

Sean T_1 y T_2 los tiempos de vida de los componentes A y B respectivamente. Asumiendo que las variables X_1 , X_2 y X_3 son independientes; hallar en función de λ_1 , λ_2 y λ_3 la probabilidad $P\{T_1 = T_2\}$.