

# SOLUCIÓN VERSIÓN 2

## Examen de Matemática Discreta I

Miércoles 7 de febrero de 2024

MO1	MO2	MO3	MO4	MO5
<i>E</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>D</i>	<i>B</i>

### Múltiple Opción 1

Hallar el coeficiente en  $x^2y^3$  del polinomio  $(x - y + 3xy + 2)^5$ .

- (A) 1450    (B) 460    (C) -10    (D) -100    (E) -730

### Solución de la Múltiple Opción 1

La fórmula de la potencia de un multinomio es:

$$(x - y + 3xy + 2)^5 = \sum_{(a,b,c,d) \in \mathbb{N}^4: a+b+c+d=5} \frac{5!}{a_1!a_2!a_3!a_4!} (x)^{a_1} (-y)^{a_2} (3xy)^{a_3} (2)^{a_4}.$$

Hay solamente 3 posibles elecciones de las tuplas naturales  $(a_1, a_2, a_3, a_4)$  que aportan al coeficiente en  $x^2y^3$ , que son precisamente  $(2, 3, 0, 0)$ ,  $(1, 2, 1, 1)$ , y  $(0, 1, 2, 2)$ . Por lo tanto, el coeficiente en  $x^2y^3$  de  $(x - y + 3xy + 2)^5$  es el mismo que el coeficiente en  $x^2y^3$  de la siguiente función

$$\frac{5!}{2!3!0!0!} (x)^2 (-y)^3 (3xy)^0 (2)^0 + \frac{5!}{1!2!1!1!} (x)^1 (-y)^2 (3xy)^1 (2)^1 + \frac{5!}{0!1!2!2!} (x)^0 (-y)^1 (3xy)^2 (2)^2.$$

Tal coeficiente es igual a  $-10 + 60 \times 3 \times 2 - 30 \times 9 = -730$ , y la opción correcta es la *E*.

### Múltiple Opción 2

Determinar la cantidad de enteros entre 1 y 462 (inclusive) que no son múltiplos ni de 3 ni de 7 ni de 11.

- (A) 200    (B) 220    (C) 240    (D) 244    (E) 262

### Solución de la Múltiple Opción 2

Sea  $\mathcal{U} = \{x \in \mathbb{Z} : 1 \leq x \leq 462\}$ . Consideremos las siguientes 3 condiciones sobre los elementos pertenecientes a  $\mathcal{U}$ :

- $c_3$ : el elemento  $x$  de  $\mathcal{U}$  es múltiplo de 3;
- $c_7$ : el elemento  $x$  de  $\mathcal{U}$  es múltiplo de 7;
- $c_{11}$ : el elemento  $x$  de  $\mathcal{U}$  es múltiplo de 11.

Para determinar la cantidad de elementos de  $\mathcal{U}$  que no son múltiplos ni de 3 ni de 7 ni de 11 vamos a emplear el principio de inclusión y exclusión dentro del conjunto  $\mathcal{U}$  con la terna de condiciones  $c_3$ ,  $c_7$  y  $c_{11}$ . Tenemos entonces lo siguiente:

$$\begin{aligned} n(\overline{c_3}, \overline{c_7}, \overline{c_{11}}) &= |\mathcal{U}| - n(c_3) - n(c_7) - n(c_{11}) + n(c_3, c_7) + n(c_3, c_{11}) + n(c_7, c_{11}) - n(c_3, c_7, c_{11}) \\ &= 462 - 2 \times 7 \times 11 - 2 \times 3 \times 11 - 2 \times 3 \times 7 + 2 \times 11 + 2 \times 7 + 2 \times 3 - 2 = 240. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la opción correcta es la *C*.

### Múltiple Opción 3

Sea  $G$  el grafo que se obtiene tras agregar al ciclo  $C_8$  precisamente 4 aristas, a saber, una arista para cada par de vértices de  $C_8$  que se encuentran a distancia igual a 4.

Consideramos las siguientes afirmaciones:

- I. El grafo  $G$  es 3-regular.
- II. El grafo  $G$  es bipartito.
- III. El grafo  $G$  tiene algún ciclo hamiltoniano.
- IV. El grafo  $G$  es plano.

Indicar la opción correcta:

- (A) Las afirmaciones II y IV son verdaderas, y las afirmaciones I y III son falsas.
- (B) Las afirmaciones II y III son verdaderas, y las afirmaciones I y IV son falsas.
- (C) Las afirmaciones I y IV son verdaderas, y las afirmaciones II y III son falsas.
- (D) Las afirmaciones I y III son verdaderas, y las afirmaciones II y IV son falsas.
- (E) Las afirmaciones I y II son verdaderas, y las afirmaciones III y IV son falsas.

### Solución de la Múltiple Opción 3

El grafo  $G$  se representa en la Figura 1. Cada vértice de  $G$  tiene grado 3, por lo que  $G$  es 3-regular. Podemos obtener el ciclo  $C_8$  quitando precisamente 4 aristas del grafo  $G$ , concretamente,  $C_8 = G - v_1v_5 - v_2v_6 - v_3v_7 - v_4v_8$ , por lo que  $G$  tiene algún ciclo hamiltoniano. El subgrafo de  $G$  inducido por el conjunto de vértices  $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$  es  $C_5$ . Como  $G$  tiene algún ciclo impar,  $G$  no es bipartito. Por último, veamos que  $G$  tiene un subgrafo que es homeomorfo a  $K_{3,3}$ . De hecho, consideremos el subgrafo  $G'$  de  $G$  dado por  $G' = G - v_1v_5$ . Tomemos los dos subconjuntos de vértices  $A$  y  $B$  de  $G'$  dados por  $A = \{v_2, v_4, v_7\}$  y  $B = \{v_3, v_6, v_8\}$ . Notemos que  $G'$  se obtiene tras tomar dos subdivisiones elementales del grafo bipartito completo cuyas partes son los conjuntos de vértices  $A$  y  $B$ . Luego,  $G'$  es homeomorfo a  $K_{3,3}$ , y por el Teorema de Kuratowski se sigue que  $G$  no es plano. Por lo tanto, la opción correcta es la  $D$ .




Figura 1: Grafo  $G$ .

### Múltiple Opción 4

Hallar el menor entero natural  $n$  tal que, dados  $n$  dígitos diferentes (entre 0 y 9 inclusive), se puede asegurar que existen dos de ellos cuyos cuadrados difieran en un múltiplo de 6.

- (A) 8    (B) 7    (C) 6    (D) 5    (E) 4

### Solución de la Múltiple Opción 4

Sean  $\mathcal{D} = \{0, 1, \dots, 9\}$  y  $\mathcal{N} = \{\{0, 6\}, \{1, 5, 7\}, \{2, 4, 8\}, \{3, 9\}\}$ . Sea  $\mathcal{P}$  un subconjunto de  $\mathcal{D}$  con 5 elementos o más. Identifiquemos a cada uno de los elementos del conjunto  $\mathcal{P}$  como las palomas y a cada una de las partes de la partición  $\mathcal{N}$  como los nidos. Como  $\mathcal{N}$  es una partición de  $\mathcal{P}$ , tenemos que cada paloma se aloja en algún nido. Además, como la partición  $\mathcal{N}$  tiene exactamente 4 partes y  $|\mathcal{P}| \geq 5$ , tenemos que  $|\mathcal{P}| > |\mathcal{N}|$ . Por el principio del Palomar siempre tendremos al menos 2 elementos de  $\mathcal{P}$  pertenecientes a alguna parte de  $\mathcal{N}$ . Es sencillo notar que cada parte de  $\mathcal{N}$  cumple que los cuadrados de sus elementos difieren en un múltiplo de 6. Hemos probado hasta el momento que cualquier elección de 5 o más dígitos cumple que tiene al menos 2 de ellos cuyos cuadrados difieren en un múltiplo de 6. Por último, notemos que el conjunto  $X$  dado por  $X = \{0, 1, 2, 3\}$  tiene 4 elementos y no cumple con dicha condición. Por lo tanto, el menor natural  $n$  que cumple la condición estudiada es 5, y la respuesta correcta es la  $D$ .

### Múltiple Opción 5

Se considera la sucesión definida por la relación de recurrencia

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} - 8a_n = 4^n \quad (n \in \mathbb{N})$$

con  $a_0 = 0$  y  $a_1 = 1$ . Entonces:

- (A)  $a_n = \frac{1}{6}4^n - \frac{1}{6}(-2)^n$   
(B)  $a_n = (\frac{1}{24}n + \frac{5}{36})4^n - \frac{5}{36}(-2)^n$   
(C)  $a_n = (\frac{1}{36}n + \frac{4}{27})4^n - \frac{4}{27}(-2)^n$   
(D)  $a_n = (\frac{1}{36}n^2 + \frac{4}{27})4^n - \frac{4}{27}(-2)^n$   
(E)  $a_n = -\frac{5}{36}(-4)^n + \frac{5}{36}2^n + \frac{1}{24}n4^n$

### Solución de la Múltiple Opción 5

Recordemos que es posible resolver recurrencias lineales a coeficientes constantes hallando una solución general del problema homogéneo correspondiente y luego sumando una solución particular del problema original.

El problema homogéneo consiste en encontrar una solución general de  $a_{n+2} - 2a_{n+1} - 8a_n = 0$ . El polinomio característico es  $x^2 - 2x + 8$ , o equivalentemente,  $(x - 4)(x + 2)$ , que tiene raíces  $-2$  y  $4$ . Entonces, la solución general del problema homogéneo es  $a_n^{(H)} = c_1(-2)^n + c_24^n$ , donde  $c_1$  y  $c_2$  son dos constantes arbitrarias.

Busquemos una solución del problema original de la forma  $a_n^{(P)} = cn4^n$ , donde  $c$  es una constante. Reemplazando la expresión de  $a_n^{(P)}$  en la recurrencia resulta que  $c$  debe satisfacer la siguiente igualdad:

$$c(n+2)4^{n+2} - 2c(n+1)4^{n+1} - 8cn4^n = 4^n \quad (n \in \mathbb{N})$$

Por lo tanto,  $(16c(n+2) - 8c(n+1) - 8cn)4^n = 4^n$ , y esta igualdad se cumple si y sólo si  $24c = 1$ , o equivalentemente, si y sólo si  $c = \frac{1}{24}$ .

Concluimos que  $a_n = a_n^{(H)} + a_n^{(P)} = c_1(-2)^n + c_24^n + \frac{n}{24}4^n$ . Por último, vamos a hallar las constantes  $c_1$  y  $c_2$  utilizando que  $a_0 = 0$  y  $a_1 = 1$ . Como  $a_0 = 0$  tenemos que  $c_1 + c_2 = 0$ , y como  $a_1 = 1$  tenemos que  $-2c_1 + 4c_2 + \frac{1}{6} = 1$ . Tras duplicar la primera ecuación y sumar la segunda tenemos que  $6c_2 + \frac{1}{6} = 1$ , o equivalentemente,  $c_2 = \frac{5}{36}$ . Por la primera ecuación tenemos entonces que  $c_1 = -c_2 = -\frac{5}{36}$ . Finalmente, reemplazando estos valores concretos de  $c_1$  y  $c_2$  en la sucesión obtenemos que  $a_n = -\frac{5}{36}(-2)^n + (\frac{5}{36} + \frac{n}{24})4^n$ , por lo que la opción correcta es la  $B$ .

## Ejercicio de Desarrollo 1

Sea  $A$  un conjunto equipado con una relación de orden  $\leq$ . Se recuerda que  $\leq$  es un *orden total* si para todos  $x, y \in A$ , tenemos que  $x \leq y$  o  $y \leq x$ . Por otro lado, se dice que  $\leq$  es un *buen orden* si todo subconjunto no vacío de  $A$  tiene mínimo.

- (1) Demostrar que si  $\leq$  es un buen orden, entonces es un orden total.
- (2) Demostrar que si  $\leq$  es un orden total, entonces tiene a lo sumo un elemento maximal.
- (3) Concluir que si  $\leq$  tiene dos elementos maximales distintos o dos elementos minimales distintos, entonces no es un buen orden.

## Solución del ejercicio de desarrollo 1

- (1) Sabemos que  $\leq$  es un buen orden. Probemos que  $\leq$  es un orden total. Sean  $x$  e  $y$  dos elementos cualesquiera de  $A$ . Notemos que  $\{x, y\}$  es un subconjunto no vacío de  $A$ . Luego, como  $\leq$  es un buen orden, el conjunto  $\{x, y\}$  tiene mínimo. Si  $x$  es mínimo entonces  $x \leq y$ ; en caso contrario  $y$  es mínimo y tenemos que  $y \leq x$ . Por lo tanto, dados dos elementos cualesquiera  $x$  e  $y$  de  $A$  se cumple que  $x \leq y$  o  $y \leq x$ , es decir que  $\leq$  es un orden total, como queríamos demostrar.
- (2) Sabemos que  $\leq$  es un orden total. Probemos que tiene a lo sumo un elemento maximal. De hecho, sean  $a_1$  y  $a_2$  maximales. Como  $\leq$  es un orden total, se debe cumplir que  $a_1 \leq a_2$  o  $a_2 \leq a_1$ . Sin pérdida de generalidad supongamos que  $a_1 \leq a_2$  (el otro caso se demuestra de forma análoga). Como  $a_1$  es maximal, el único elemento  $x$  de  $A$  que cumple que  $a_1 \leq x$  es  $a_1$ , por lo que  $a_1 = a_2$ . Por lo tanto, existe a lo sumo un elemento maximal, como queríamos demostrar.
- (3) Por el contrarrecíproco de (2), si  $\leq$  tiene dos elementos maximales distintos entonces  $\leq$  no es un orden total. Luego, por el contrarrecíproco de (1) se sigue que  $\leq$  no es un buen orden, como queríamos demostrar.

## Ejercicio de Desarrollo 2

El objetivo de este ejercicio es usar un principio de inducción para probar que

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

para todo entero  $n \geq 1$ . Para conseguirlo, se pide realizar los siguientes pasos:

- (1) Indicar si se va a utilizar el principio de inducción simple o fuerte.
- (2) Definir la propiedad sobre los naturales positivos  $P(n)$  a la cual se le va a aplicar dicho principio de inducción.
- (3) Enunciar el paso de base.
- (4) Probar el paso de base.
- (5) Enunciar el paso inductivo.
- (6) Probar el paso inductivo.
- (7) Concluir.

## Solución del ejercicio de desarrollo 2

Vamos a ordenar la demostración siguiendo los 7 pasos sugeridos en la letra.

- (1) Vamos a emplear el principio de inducción simple sobre el conjunto de enteros positivos.
- (2) Consideremos la propiedad  $P$  definida por  $P(n) : \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ .
- (3) El paso de base consiste en probar  $P(1)$ .
- (4) Para probar  $P(1)$ , vamos a calcular primero el miembro izquierdo y luego el miembro derecho, para finalmente probar que son iguales. Por un lado, el miembro izquierdo es  $\sum_{i=1}^1 i^2 = 1^2 = 1$ . Por otro lado, el miembro derecho es  $\frac{1 \times (1+1)(2 \times 1 + 1)}{6} = 1$ . Luego, ambos miembros de la expresión  $P(1)$  son iguales, y se cumple  $P(1)$ .
- (5) El paso inductivo consiste en asumir  $P(h)$  para cierto entero positivo fijo  $h$  y probar  $P(h+1)$ .
- (6) Probemos el paso inductivo. Notemos que  $\sum_{i=1}^{h+1} i^2 = \sum_{i=1}^h i^2 + (h+1)^2$ . Por hipótesis inductiva sabemos que es cierto  $P(h)$ , por lo que  $\sum_{i=1}^h i^2 = \frac{h(h+1)(2h+1)}{6}$ . Reemplazando en la igualdad anterior tenemos que  $\sum_{i=1}^{h+1} i^2 = \frac{h(h+1)(2h+1)}{6} + (h+1)^2$ . Ahora tomando factor común  $(h+1)$  tenemos que  $\sum_{i=1}^{h+1} i^2 = (h+1) \left( \frac{h(2h+1)}{6} + (h+1) \right)$ . Tras tomar denominador común 6 y operar, tenemos que  $\sum_{i=1}^{h+1} i^2 = \frac{(h+1)(2h^2+h+6(h+1))}{6} = \frac{(h+1)(2h^2+7h+6)}{6}$ . Por último, notemos que  $2h^2 + 7h + 6 = (h+2)(2h+3)$ . Reemplazando en la última expresión obtenemos que  $\sum_{i=1}^{h+1} i^2 = \frac{(h+1)(h+2)(2h+3)}{6}$ . Reescribiendo, tenemos que  $\sum_{i=1}^{h+1} i^2 = \frac{(h+1)((h+1)+1)(2(h+1)+1)}{6}$ , por lo que  $P(h+1)$  es cierta, como queríamos demostrar.
- (7) Por las partes (4) y (6), tanto el paso base como el paso inductivo son correctos. Por el principio de inducción completa sobre los enteros positivos podemos afirmar que para todo entero positivo  $n$  se cumple  $P(n)$ .