

# Cálculo Diferencial e Integral en Varias Variables

Primer semestre de 2024

Primer parcial

30 de abril de 2024

| Nº Lista | Apellido, Nombre | Cédula | Firma |
|----------|------------------|--------|-------|
|          |                  |        |       |

## IMPORTANTE

- La duración del parcial es de tres horas y media.
- No se permite usar ni calculadora ni material de consulta.
- El parcial tiene 5 ejercicios de múltiple opción y un ejercicio de desarrollo con 2 partes.
- En cada ejercicio de múltiple opción solo hay una opción correcta.
- La comprensión de la letra de los ejercicios es parte de la prueba.
- **Tenga cuidado al pasar las respuestas. Para los ejercicios de múltiple opción lo completado en el cuadro de abajo será lo único tenido en cuenta a la hora de corregir.**
- Recuerde que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ .
- La siguiente tabla de valores para las funciones seno y coseno puede ser de utilidad:

| $x$       | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| $\sin(x)$ | 0 | $\frac{1}{2}$        | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               |
| $\cos(x)$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               |

## MÚLTIPLE OPCIÓN (Total: 25 puntos)

Llenar cada casilla con las respuestas **A**, **B**, **C**, **D** o **E**, según corresponda.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |

Correctas: 5 puntos. Incorrectas: -1 puntos. Sin responder: 0 puntos.

## DESARROLLO (Total: 15 puntos)

Un ejercicio de desarrollo se encuentra al final de la página 2.

## SOLO PARA USO DOCENTE

| MO | D.1.a) | D.1.b) | D.2 | Total |
|----|--------|--------|-----|-------|
|    |        |        |     |       |

---

## MÚLTIPLE OPCIÓN

---

1. Sea  $y(x)$  la solución a la ecuación diferencial

$$y''(x) + 2y'(x) + y(x) = \cos(x)$$

que cumple  $y(0) = 0, y'(0) = 1$ . Entonces:

- (A)  $y(\pi) = e^{-\pi} + 1$       (B)  $y(\pi) = \pi e^{-\pi} + \frac{1}{2}$   
(C)  $y(\pi) = \frac{\pi}{2} e^{-\pi}$       (D)  $y(\pi) = \frac{\pi}{4} e^{-\pi}$   
(E)  $y(\pi) = -1$
- 

2. Sea  $A \subset \mathbb{C}$  el conjunto de los números  $z \in \mathbb{C}$  que verifican:

$$\begin{cases} z^5 = \frac{\sqrt{3} + i}{\sqrt{3} - i} \\ z + \bar{z} > 0 \end{cases}$$

Solo una de las siguientes afirmaciones sobre el conjunto  $A$  es correcta. Indique cuál:

- (A)  $A$  tiene exactamente cinco elementos distintos.  
(B)  $A$  es simétrico respecto al eje real.  
(C)  $A$  es simétrico respecto al eje imaginario.  
(D)  $A$  tiene exactamente cuatro elementos distintos.  
(E)  $A$  tiene exactamente tres elementos distintos.
- 

3. Considere las siguientes integrales impropias:

(I)  $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{(4 + \cos(x))(x + 2\sqrt{x})}{(e^{-x} + \sqrt{x})x} dx$   
(II)  $\int_0^1 \frac{e^{-x^2} + 1}{e^{\sqrt{x}} - 1} dx$

Entonces:

- (A) Ambas integrales convergen absolutamente.  
(B) Ambas integrales no convergen.  
(C) La integral (I) converge y la integral (II) no converge.  
(D) La integral (I) no converge y la integral (II) converge.  
(E) La integral (I) converge, pero no converge absolutamente y la integral (II) converge.
- 

4. Considere las siguientes series:

(I)  $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$       (II)  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{k^n n!}{n^n}$

Entonces:

- (A) La serie (I) converge absolutamente y para todo  $k > 2$  la serie (II) converge.  
(B) La serie (I) no converge y para todo  $k > e$  la serie (II) converge.  
(C) La serie (I) converge, pero no converge absolutamente, y para  $k = 2$  la serie (II) converge.  
(D) La serie (I) converge absolutamente y para todo  $k > e$  la serie (II) no converge.  
(E) La serie (I) converge, pero no converge absolutamente, y para  $k = 4$  la serie (II) converge.
- 

5. Recuerde que decimos que  $L$  es un punto de aglomeración de la sucesión  $a_n$  si existe una subsucesión de  $a_n$  que converge a  $L$ .

Considere la sucesión  $a_n = \frac{n}{2n+1} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ . Entonces:

- (A)  $a_n$  tiene exactamente 3 puntos de aglomeración, pero no tiene límite.  
(B)  $a_n$  tiene exactamente 2 puntos de aglomeración, pero no tiene límite.  
(C)  $a_n$  tiene exactamente 1 punto de aglomeración, pero no tiene límite.  
(D)  $a_n$  tiene límite finito.  
(E)  $a_n$  tiende a  $+\infty$ .
- 

## DESARROLLO

---

1. a) Sea  $b_n$  una sucesión de términos no negativos, tal que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = L < 1$ . Demostrar que existen  $k \in (0, 1)$  y  $n_0 \in \mathbb{N}$  tales que  $b_n < k, \forall n \geq n_0$ .  
b) Sea  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$  una serie de términos positivos. Demostrar que si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L < 1$ , entonces la serie es convergente.
2. Usando el resultado de la parte anterior, clasificar la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\log n)^n}{n^n}$$

---