## PRÁCTICO 6

Sucesiones definidas por relaciones de recurrencia (Secciones 10.1, 10.2 y 10.3)

**Ejercicio 1.** Expresar  $a_n$  en función de los términos anteriores  $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}$ , siendo  $a_n$ :

- (a) La cantidad de saludos entre las primeras n personas que llegan a una reunión.
- (b) El número de secuencias de ceros y unos de largo n en las cuales no aparecen dos ceros seguidos.
- (c) El número de secuencias de largo n de letras A, B y C que no tienen la letra A dos veces seguidas.
- (d) La cantidad de formas de subir una escalera de n escalones si se pueden subir de a uno o de a dos escalones en cada paso.
- (e) Lo anterior pero sin que se puedan saltar dos veces seguidas un escalón (o sea, que si se saltea un escalón, entonces el siguiente no se saltea).
- (f) El número de secuencias de unos y doses que suman n. Por ejemplo, para n=3 hay exactamente 3 secuencias: 111, 12 y 21.

**Ejercicio 2.** Para un campeonato de ajedrez se tiene una cantidad par de ajedrecistas. Se quiere armar la primera fecha (en una fecha todos los ajedrecistas juegan exactamente un partido). Sea  $a_k$  la cantidad de formas de armar la primera fecha de un campeonato con 2k ajedrecistas.

- (a) Calcular  $a_1$ ,  $a_2$  y  $a_3$ .
- (b) Deducir que para todo entero positivo k se cumple que  $a_{k+1} = (2k+1)a_k$ .
- (c) Probar que para todo entero positivo k se cumple que  $a_k = (2k-1) \times (2k-3) \times ... \times 3 \times 1$ .

**Ejercicio 3.** Se pretende diseñar una bandera con n franjas horizontales, cada una de las cuales puede ser de color rojo, azul, verde o amarillo. Hallar la cantidad de banderas posibles en cada una de las siguientes situaciones:

- (a) No hay restricciones sobre el color de cada franja.
- (b) Dos franjas advacentes nunca pueden ser del mismo color.
- (c) Dos franjas adyacentes nunca pueden ser del mismo color, como tampoco pueden serlo la primera y la última franjas.

**Ejercicio 4.** Consideremos la sucesión  $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$  definida por  $a_n=(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n+(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n$ .

- (a) Mostrar que  $a_n$  verifica una relación de recurrencia de orden 2, homogénea, a coeficientes constantes.
- (b) Probar que  $a_n$  es un entero positivo para todo natural n.

**Ejercicio 5.** En cada caso hallar el término  $a_{100}$ :

- (a)  $a_{n+1} 3a_n = 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , con  $a_{50} = 2 \cdot 3^{-8}$ .
- (b)  $a_{n+2} + 4a_n = 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , con  $a_0 = a_1 = 1$ . Sugerencia: emplear el cambio de variable  $b_n = a_{2n}$ .

Ejercicio 6. Resolver las relaciones de recurrencia:

- (a)  $a_{n+2} = 5a_{n+1} 6a_n$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , con  $a_0 = 1, a_1 = 3$ .
- (b)  $b_{n+2} 6b_{n+1} + 9b_n = 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , con  $b_0 = 5, b_2 = 27$ .

**Ejercicio 7.** Resolver las relaciones de recurrencia:

- (a)  $c_{n+1} = c_n + n2^{n-1}$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , con  $c_0 = 0$ .
- (b)  $d_n = \frac{1}{2}d_{n-1} + \frac{1}{2}d_{n+1} + 1$ ,  $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ , con  $d_0 = d_{100} = 0$ .
- (c)  $e_{n+1}=2e_n+2^n$ ,  $\forall n\in\mathbb{N}$ , con  $e_0=0$ .
- (d)  $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , con  $f_0 = f_1 = 1$ .

Ejercicio 8. Aplicar cambios de variables para resolver las cada una de las siguientes recurrencias:

- (a)  $a_n na_{n-1} = 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ , con  $a_0 = 1$ .
- (b)  $na_n (n-1)a_{n-1} = 0, \forall n \in \mathbb{Z}, n > 2.$
- (c)  $a_n/a_{n-1}^p=2$ ,  $\forall n\in\mathbb{Z}^+$ , siendo  $a_0=1$  y p un entero mayor que 1.
- (d)  $a_{n+2} = 4a_{n+1}^2/a_n$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , siendo  $a_0 = a_1 = 1$

**Ejercicio 9.** (Primer Parcial 2009)

Sabemos que  $a_0=1$  y que para cada entero positivo n se cumple que  $a_n-2a_{n-1}=3\times 2^n$ . Indicar la opción correcta: (a)  $a_{50}=2^{50}$ ; (b)  $a_{50}=50\times 2^{50}$ ; (c)  $a_{50}=150\times 2^{50}$ ; (d)  $a_{50}=151\times 2^{50}$ .

**Ejercicio 10.** Se considera la siguiente recurrencia:  $a_n + \alpha a_{n-1} + \beta a_{n-2} = 2^n$ ,  $\forall n \geq 2$ . Hallar  $\alpha$ ,  $\beta$  y  $a_{100}$  sabiendo que:  $a_0 = 1$ ,  $a_1 = 5$ ,  $a_2 = 1$  y  $a_3 = 17$ .