

## Práctico 1 Inducción Completa

Ref. Grimaldi Sección 4.1

**Ejercicio 1** Demuestre que  $7^n - 2^n$  es divisible por 5, para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

**Ejercicio 2** Encuentre (y demuestre) cuáles números naturales  $n$  pueden expresarse como suma de treses y/o cincos, es decir,

$$\text{existen } i, j \in \mathbb{N} \cup \{0\} : n = 3i + 5j.$$

**Ejercicio 3** (Exam. diciembre 2009 Ej6)) Demuestre por inducción completa que  $10^{n+1} + 3 \times 10^n + 5$  es múltiplo de 9 para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

**Ejercicio 4** Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Conjeture una fórmula para  $A^n$  y demuéstrela.

**Ejercicio 5** (a) Demuestre la siguiente igualdad:

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

(b) (Exam. octubre 2001 Ej8 a)) Demuestre que para  $n \geq 1$  se cumple la siguiente igualdad:

$$\sum_{i=1}^n (2i-1)^3 = n^2(2n^2-1).$$

**Ejercicio 6** (1er Par. octubre 2000 Ej16) Sea  $m$  el menor número natural que verifica  $2^m > m^2 + 1$ . Halle  $m$  y pruebe por inducción que si  $n \geq m$  entonces  $2^n > n^2 + 1$ .

**Ejercicio 7** Demuestre que en la lista de inscriptos al curso de Matemática Discreta I, 2016, hay una cantidad par de estudiantes que tienen una cantidad impar de amigos inscriptos en el mismo curso (no vale llamar a Bedelía).

**Ejercicio 8** Sean  $f(x) = xe^x$  y  $g(x) = 1/x$ , demuestre las siguientes igualdades para las derivadas  $n$ -ésimas:

$$f^{(n)}(x) = e^x(x+n) \quad g^{(n)}(x) = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}.$$

**Ejercicio 9** Para  $n \in \mathbb{N}$  sea  $S$  un subconjunto de números reales con  $|S| = 2^n$ . Demuestre que el número de comparaciones necesarias para ordenar en forma ascendente los elementos de  $S$  es menor o igual que  $n \times 2^n$ .

**Ejercicio 10** Demuestre que:

1.  $n^3 - n$  es divisible por 3 para todo  $n$  entero.
2. La suma de los cubos de tres enteros consecutivos es divisible por 9.

**Ejercicio 11** Demuestre que todo natural  $n$  puede expresarse como la suma de cinco y/o siete siempre que  $n$  sea mayor o igual a 24, es decir para todo  $n \geq 24$  existen  $i, j \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  tales que  $n = 5i + 7j$ .

**Ejercicio 12** (Exam. octubre 2001 Ej8 a)) Demuestre que si

$$a_n = 2a_{n-1} + 7a_{n-2} + a_{n-3}$$

y  $a_1 = 3, a_2 = 10, a_3 = 30$ , entonces

$$a_n \geq 3^n \quad \text{para todo } n \geq 1.$$

**Ejercicio 13** Se define

$$S_n = \sum_{i=1}^n i! \cdot i \quad \text{para todo } n \geq 1.$$

Demuestre que  $S_n = (n+1)! - 1$ .

**Ejercicio 14** Considere un tablero cuadrulado de  $2^n$  cuadrados por lado al cual le falta un cuadradito en algún lugar. Demuestre que se puede cubrir dicho tablero con piezas en forma de L formadas por 3 cuadraditos cada una.

**Ejercicio 15** La sucesión  $F_n$  de Fibonacci se define recursivamente del siguiente modo:

$F_0 = 0, F_1 = 1$  y

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad \text{para todo } n \geq 2.$$

Pruebe que:

1.  $\sum_{i=0}^n F_i = F_{n+2} - 1$ .
2.  $\sum_{i=1}^{2n} F_i F_{i-1} = F_{2n}^2$ .
3.  $\sum_{i=1}^n F_i^2 = F_n F_{n+1}$ .

**Ejercicio 16** Se considera la función  $f$  definida sobre  $\mathbb{R} \setminus \{-\frac{2}{3}\}$  por :

$$f(x) = \frac{1}{3x+2}.$$

Demuestre que la derivada  $n$ -ésima de  $f$  es:

$$f^{(n)}(x) = \frac{3^n (-1)^n n!}{(3x+2)^{n+1}}.$$

**Ejercicio 17** Considere la suma

$$\sum_{i=0}^n C_m^i.$$

Calcúlela para algunos casos usando triángulo de Pascal, conjeture cuánto suma en general y demuéstrela por inducción. *Aclaración:* Si  $i < m$  entonces  $C_m^i = 0$ .