Solución de la Evaluación

Ejercicio 2

```

% mov(Direccion, Pared) <- Dirección posible de movimiento, y la Pared que debo
%                               revisar
mov(sur, pared_sur).
mov(norte, pared_norte).
mov(este, pared_este).
mov(oeste, pared_oeste).

% nueva_coord(Direccion, Pos, NewPos) <- NewPos es la posición que se encuentra
%                               en la Dirección de Pos.
nueva_coord(sur, (X,Y), (X1,Y1)):-X1 is X+1.
nueva_coord(norte, (X,Y), (X1,Y1)):-X1 is X-1.
nueva_coord(este, (X,Y), (X,Y1)):-Y1 is Y+1.
nueva_coord(oeste, (X,Y), (X,Y1)):-Y1 is Y-1.

% buscar(Objeto, Pos, Movs, Visitados, Lugar) <- Movs es la lista de movimientos que
%                               tiene que realizar el robot para llegar al Lugar donde está el Objeto.
%                               Visitados es la lista de posiciones por las que pasa en su recorrido.
buscar(Objeto, Pos, [], _, Pos):-
    visible(Objetos),
    member(Objeto,Objetos),
    !.

buscar(Objeto, Pos, [mover(Dir)|Movs], Visitados, Lugar):-
    visible(Objetos),
    mov(Dir,Pared),
    +\ member(Pared,Objetos),
    nueva_coord(Dir,Pos,NewPos),
    +\ member(NewPos,Visitados),
    mover(Dir),
    buscar(Objeto,NewPos,Movs,[NewPos|Visitados],Lugar).

% ver especificación en la letra.
recarga(Baterias,Cargador,Movs):-
    buscar(bateria, (0,0), MovsB, [(0,0)], Baterias),
    obtener(bateria),
    buscar(cargador, Baterias, MovsC, [Baterias], Cargador),
    recargar,
    append(MovsB,[obtener(bateria)|MovsC], MovsAux),
    append(MovsAux,[recargar],Movs).

% member(X,Xs) <- X es un elemento de la lista Xs.
member(X,[X|_]).
member(X,[_|Xs]) :- member(X,Xs).

% append(Xs,Ys,Zs) <- Zs es la concatenación de Xs con Ys.
append([],Ys,Ys).
append([X|Xs],Ys,[X|Zs]):- append(Xs,Ys,Zs).

```

Ejercicio 3

a) Las soluciones son $Xs = [a, a, b]$ y $Xs = [b, a, a]$. Este es un trace de la ejecución:

```
tira([b, b, b, a, a, b, b], Xs)
  tira([b, b, a, a, b, b], Xs, [])
    tira([b, a, a, b, b], Xs, [b])
      tira([a, a, b, b], Xs, [b, b])
        tira([a, b, b], Xs, [a, b, b])
          tira([b, b], Xs, [a, a, b, b])
            tira([b], Xs, [b, a, a, b, b])
              tira([], Xs, [b, b, a, a, b, b]) Falla
              multi([b, a, a, b, b]) Falla
            multi([a, a, b, b]) Falla
          multi([b]) Falla
        multi([]) Falla
      tira([b, b, a, a, b, b], Xs) (*)
        tira([b, a, a, b, b], Xs, [])
          tira([a, a, b, b], Xs, [b])
            tira([a, b, b], Xs, [a, b])
              tira([b, b], Xs, [a, a, b])
                tira([b], Xs, [b, a, a, b])
                  tira([], Xs, [b, b, a, a, b]) Falla
                  multi([b, a, a, b]) Falla
                multi([a, a, b]) Xs = [a, a, b]
              multi([]) Falla
            tira([b, a, a, b, b], Xs) (**)
              tira([a, a, b, b], Xs, [])
                tira([a, b, b], Xs, [a])
                  tira([b, b], Xs, [a, a])
                    tira([b], Xs, [b, a, a])
                      tira([], Xs, [b, b, a, a]) Falla
                      multi([b, a, a]) Xs = [b, a, a]
                    multi([a, a]) Falla
                  tira([a, a, b, b], Xs)
                    tira([a, b, b], Xs)
                      tira([b, b], Xs)
                        tira([b], Xs, [])
                          tira([], Xs, [b]) Falla
                          multi([]) Falla
                        tira([b], Xs)
                          tira([], Xs, []) Falla
                          tira([], Xs) Falla
```

b)

- i) Se corta la rama marcada con (*), así que no hay soluciones.
- ii) Se corta la rama marcada con (**), así que se da solo la primera solución.

Ejercicio 4

a)

```
% Se usan listas rectas para los goals y el predicado clausula
% de consulta de la base de predicados.
```

```
resAviso([], _, _).
```

```
resAviso([H|T], N, M) :-
```

```
    M > 0,
```

```
    check(N),
```

```
    clausula(H, Body),
```

```
    N1 is N-1,
```

```
    M1 is M-1,
```

```
    append(Body, T, Goal),
```

```
    resAviso(Goal, N1, M1).
```

```
check(0) :-
```

```
    writeln('Cuidado, árbol muy profundo'),
```

```
    !.
```

```
check(_).
```

b) Ver teórico.

Ejercicio 5

a)

i. **Árbol para $\leftarrow q(X,a)$:**

1	$q(X_1, Y_1) \leftarrow p(f(Z_1), Y_1), q(X_1, Z_1)$ $\theta_1 = \{X/X_1, Y_1/a\}$	2	$q(X_2, Y_2) \leftarrow p(X_2, f(Y_2))$ $\theta_2 = \{X/X_2, Y_2/a\}$	3	$p(f(X_3), f(X_3))$ $\theta_3 = \{X_3/a, X_2/f(a)\}$
----------	---	----------	--	----------	---

ii. **Árbol para $\leftarrow q(a,X)$:**

1	$q(X_1, Y_1) \leftarrow p(f(Z_1), Y_1), q(X_1, Z_1)$ $\theta_1 = \{X/Y_1, X_1/a\}$	8	$p(a, f(b))$ $\theta_8 = \{Y_7/b\}$
2	$q(X_2, Y_2) \leftarrow p(X_2, f(Y_2))$ $\theta_2 = \{X/Y_2, X_2/a\}$	9	$q(X_9, Y_9) \leftarrow p(f(Z_9), Y_9), q(X_9, Z_9)$ $\theta_9 = \{X_9/a, Y_9/a\}$
3	$p(f(X_3), f(X_3))$ $\theta_3 = \{Z_1/X_3, Y_1/f(X_3)\}$	10	$q(X_{10}, Y_{10}) \leftarrow p(X_{10}, f(Y_{10}))$ $\theta_{10} = \{X_{10}/a, Y_{10}/a\}$
4	$p(f(a), d)$ $\theta_4 = \{Y_1/d, Z_1/a\}$	11	$q(X_{11}, Y_{11}) \leftarrow p(f(Z_{11}), Y_{11}), q(X_{11}, Z_{11})$ $\theta_{11} = \{X_{11}/a, Y_{11}/b\}$
5	$p(f(b), c)$ $\theta_5 = \{Z_1/b, Y_1/c\}$	12	$q(X_{12}, Y_{12}) \leftarrow p(X_{12}, f(Y_{12}))$ $\theta_{12} = \{X_{12}/a, Y_{12}/b\}$
6	$q(X_6, Y_6) \leftarrow p(f(Z_6), Y_6), q(X_6, Z_6)$ $\theta_6 = \{X_6/a, X_3/Y_6\}$	13	$p(a, f(b))$ $\theta_{13} = \{Y_2/b\}$
7	$q(X_7, Y_7) \leftarrow p(X_7, f(Y_7))$ $\theta_7 = \{X_7/a, X_3/Y_7\}$	14	$p(a, f(b))$ $\theta_{14} = \epsilon$

iii. Árbol para $\leftarrow q(X,X)$:

1	$q(X_1, Y_1) \leftarrow p(f(Z_1), Y_1), q(X_1, Z_1)$ $\theta_1 = \{X/X_1, Y_1/X_1\}$	7	$q(X_7, Y_7) \leftarrow p(X_7, f(Y_7))$ $\theta_7 = \{X_7/f(X_3), Y_7/X_3\}$
2	$q(X_2, Y_2) \leftarrow p(X_2, f(Y_2))$ $\theta_2 = \{X/X_2, Y_2/X_2\}$	8	$p(f(X_8), f(X_8))$ $\theta_8 = \{X_3/X_8\}$
3	$p(f(X_3), f(X_3))$ $\theta_3 = \{Z_1/X_3, Y_1/f(X_3)\}$	9	$q(X_9, Y_9) \leftarrow p(f(Z_9), Y_9), q(X_9, Z_9)$ $\theta_9 = \{X_9/d, Y_9/a\}$
4	$p(f(a), d)$ $\theta_4 = \{X_1/d, Z_1/a\}$	10	$q(X_{10}, Y_{10}) \leftarrow p(X_{10}, f(Y_{10}))$ $\theta_{10} = \{X_{10}/d, Y_{10}/a\}$
5	$p(f(b), c)$ $\theta_5 = \{Z_1/b, X_1/c\}$	11	$q(X_{11}, Y_{11}) \leftarrow p(f(Z_{11}), Y_{11}), q(X_{11}, Z_{11})$ $\theta_{11} = \{X_{11}/c, Y_{11}/b\}$
6	$q(X_6, Y_6) \leftarrow p(f(Z_6), Y_6), q(X_6, Z_6)$ $\theta_6 = \{X_6/f(X_3), Y_6/X_3\}$	12	$q(X_{12}, Y_{12}) \leftarrow p(X_{12}, f(Y_{12}))$ $\theta_{12} = \{X_{12}/c, Y_{12}/b\}$

b)

- i. $\leftarrow q(X,a)$: θ_1 y θ_2 no son computadas, por ser $\{X/f(a)\}$ la única respuesta del árbol SLD. Tampoco son correctas, puesto que no se pueden obtener a partir de la composición de $\{X/f(a)\}$ con otra sustitución.
- ii. $\leftarrow q(a,X)$: θ_1 es computada puesto que aparece en el árbol SLD, y por tanto es correcta. En cambio, θ_2 no es computada (no aparece en el árbol SLD), y tampoco es correcta, puesto que no se puede obtener a partir de la respuesta computada componiéndola con otra sustitución.
- iii. $\leftarrow q(X,X)$: θ_1 y θ_2 no son computadas (no figuran en el árbol SLD), ni correctas (no se pueden obtener a partir de la única respuesta computada $\{X/f(Y)\}$).

c)

- i. $\leftarrow q(X,a)$: $X=f(a)$;
no.
- ii. $\leftarrow q(a,X)$: $X=b$;
 $X=c$;
 $X=f(b)$;
 $X=f(c)$;
 $X=f(f(b))$;
...
- iii. $\leftarrow q(X,X)$: $X=f(Y)$;
...

d)

- i. $\leftarrow q(X,a)$: $X=f(a)$;
no.
- ii. $\leftarrow q(a,X)$: ...
- iii. $\leftarrow q(X,X)$: ...

e) Para probar la negación de un objetivo, todas las ramas del árbol SLD tienen que ser de falla («árbol finitamente fallado»). Los árboles para G_1 y G_2 no cumplen la condición, pues ambos tienen al menos una solución (además, el árbol para G_2 tampoco es finito).