


PRÁCTICO 6  
 Relaciones I

**Ejercicio 1.** Determine si las siguientes relaciones son reflexivas, simétricas, antisimétricas, asimétricas  $((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \notin R)$  o transitivas en  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ :

- a.  $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4)\}$ .
- b.  $R = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$ .
- c.  $R = \{(1, 3), (1, 1), (3, 1), (1, 2), (3, 3), (4, 4)\}$ .
- d.  $R = \emptyset$ .
- e.  $R = A \times A$ .

**Ejercicio 2.** Determine si las relaciones siguientes son reflexivas, simétricas, antisimétricas, asimétricas o transitivas en  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , donde cada relación se representa en un grafo dirigido (o digrafo):



**Ejercicio 3.** Demuestre o halle un contraejemplo a las siguientes afirmaciones:

- a. El producto de dos relaciones puede ser una función sin que ninguna de ellas lo sea.
- b. La inversa de una relación puede ser una función sin que ella misma lo sea.
- c. El producto de dos relaciones puede dar la relación vacía sin que ninguna de ellas lo sea.

**Ejercicio 4.** Considere el conjunto de propiedades  $P = \{\text{reflexiva, simétrica, transitiva}\}$ . Para cada subconjunto  $T$  de  $P$ , encuentre una relación que cumpla las propiedades de  $T$  y no cumpla las de  $P \setminus T$ .

**Ejercicio 5.** Sean  $R$  y  $S$  relaciones en un conjunto  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ .

- a. Si  $R$  y  $S$  son *simétricas*: ¿lo serán también  $\bar{R}$ ,  $R^{-1}$ ,  $RS$ ,  $R \cup S$ ,  $R \cap S$ ?
- b. Ídem a los casos anteriores sustituyendo *simétrica* por *reflexiva*, *antisimétrica*, *asimétrica* y *transitiva*.

**Ejercicio 6.** Determinar la cantidad de relaciones  $R$  que se pueden definir sobre el conjunto  $A = \{a, b, c, d\}$  que verifican simultáneamente las 3 condiciones siguientes:  $R$  es simétrica;  $(a, b) \in R$ ;  $(c, c) \in R$ .

**Ejercicio 7.** ¿Cuántas relaciones binarias en  $A = \{1, 2, \dots, n\}$  son reflexivas? Repita el mismo ejercicio cambiando reflexivas por simétricas y reflexivas por antisimétricas.

### Ejercicios de relaciones de equivalencias:

**Ejercicio 8.** Dada una función  $f : A \rightarrow B$ , definimos la relación en  $A$  dada por:  $xR_f y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$ .

- Demostrar que  $R_f$  es una relación de equivalencia en  $A$ .
- Demostrar que para toda relación de equivalencia  $S$  existe una función  $f$  tal que  $R_f = S$ .

**Ejercicio 9.** En cada uno de los siguientes casos, probar que  $R$  es una relación de equivalencia en  $A$  y describir las clases de equivalencia de la relación:

- $A = \{1, 2, 3, 4, \dots, 100\}$  y  $aRb$  si  $\lfloor \sqrt{a} \rfloor = \lfloor \sqrt{b} \rfloor$ , donde  $\lfloor x \rfloor$  denota la parte entera de  $x$ .
- $A = \{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30\}$  y  $aRb$  si  $a - b$  es un número par.
- $A = \mathbb{Z}$  y  $aRb$  si  $a - b$  es múltiplo de 3.

**Ejercicio 10.** Probar que si  $R$  es una relación en  $A$  que es simétrica y transitiva, tal que para todo  $a$  en  $A$  existe algún elemento  $b$  en  $A$  tal que  $aRb$ , entonces  $R$  es una relación de equivalencia en  $A$ .

**Ejercicio 11.** Hallar la cantidad de relaciones de equivalencia definidas en  $\{1, 2, 3\}$ .

**Ejercicio 12.** Hallar la cantidad de relaciones de equivalencia en  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  que tienen exactamente 3 clases de equivalencia.

**Ejercicio 13.** Hallar la cantidad de relaciones de equivalencia  $R$  sobre el conjunto  $A = \{0, \dots, 9\}$  con  $\#[0] = 5$  y  $\#[2] = 3$ .

**Ejercicio 14.** En cada caso hallar la cantidad de relaciones de equivalencia  $R$  en  $\{0, 1, \dots, 7\}$  tales que:

- $\#[0] = 2$  y  $\#[1] = 4$ .
- $\#[0] < \#[1] < \#[2]$  y  $(3, 4) \in R$ .

### ALGUNAS NOTACIONES:

- $R^{-1}$  denota la relación inversa, o sea  $R^{-1} = \{(x, y) : (y, x) \in R\}$ ;
- $\bar{R}$  la relación complementaria, o sea,  $\bar{R} = \{(x, y) : (x, y) \notin R\}$
- $RS$  el producto de las relaciones  $R$  y  $S$  (denotado como  $R \circ S$  en el libro de Grimaldi), o sea  $RS = \{(x, z) : \exists y, (x, y) \in R \text{ y } (y, z) \in S\}$ .

**Ejercicio 9.** En cada uno de los siguientes casos, probar que  $R$  es una relación de equivalencia en  $A$  y describir las clases de equivalencia de la relación:




(a)  $A = \{1, 2, 3, 4, \dots, 100\}$  y  $aRb$  si  $\lfloor \sqrt{a} \rfloor = \lfloor \sqrt{b} \rfloor$ , donde  $\lfloor x \rfloor$  denota la parte entera de  $x$ .

(b)  $A = \{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30\}$  y  $aRb$  si  $a - b$  es un número par.

(c)  $A = \mathbb{Z}$  y  $aRb$  si  $a - b$  es múltiplo de 3.

(a)  $aRb$  si  $f(a) = f(b)$  donde  $f(x) = \lfloor \sqrt{x} \rfloor$

En el ejercicio 8a vimos que esto es una relación de equivalencia.



$\Rightarrow$  Las clases de equivalencia son



$C_i = \{a_1, \dots, a_n\}$   $a_{n+1}$   
 $\uparrow$  perfecto  $\uparrow$  siguiente perfecto.

(b) Reflexiva:  $a - a = 0$  es par  $\Rightarrow aRa \quad \forall a \in A \quad \checkmark$

Simetría: si  $a - b$  es par  $\Rightarrow b - a$  es par  $\checkmark$

Transitividad: si  $\begin{cases} a - b \text{ par} \\ b - c \text{ par} \end{cases} \Rightarrow a - c = \underbrace{a - b}_{\text{par}} + \underbrace{b - c}_{\text{par}} \checkmark$

$\Rightarrow$  es par



$[0] = [6] = [12] = [18] = [24] = [30]$

$= \{0, 6, 12, 18, 24, 30\}$

$[3] = \{3, 9, 15, 21, 27\}$

**Ejercicio 11.** Hallar la cantidad de relaciones de equivalencia definidas en  $\{1, 2, 3\}$ .

123

1 clase de equivalencia

1

23

$P = \{\{1\}, \{2, 3\}\}$

2

13

$S(3, 2)$

2 clases

3

12

1

2

3

$S(3, 3)$

3 clases.

$\Rightarrow$  hay 5 relaciones de equivalencia.

**Ejercicio 13.** Hallar la cantidad de relaciones de equivalencia  $R$  sobre el conjunto  $A = \{0, \dots, 9\}$  con  $\# [0] = 5$  y  $\# [2] = 3$ .

\* \*  
0 x \*

$C_4^8$

\* \*

$C_2^4$

\* \*

1

\* \*  
0 x \*

$C_4^8$

\* \*

$C_2^4$

\*

1

\*


hay  $2 \cdot C_4^8 \cdot C_2^4$   
relaciones de eq.  
con  $\# [0] = 5$  y  
 $\# [2] = 3$ .

Ejercicio 14. En cada caso hallar la cantidad de relaciones de equivalencia  $R$  en  $\{0, 1, \dots, 7\}$  tales que:


a.  $\#[0] = 2$  y  $\#[1] = 4$ .

b.  $\#[0] < \#[1] < \#[2]$  y  $(3, 4) \in R$ .

(a)



Hay 12  $\cdot C_3^5$



(b)  $\#[0] < \#[1] < \#[2]$  y  $(3, 4) \in R$

0, 1 y 2 pertenecen a tres clases de equivalencia distinta.

Como  $\#[0] \geq 1$  y la unión de las clases da una partición del conjunto

$\#[0] = 1$   
 $\#[1] = 2$   
 $\#[2] = 3$

A

$\#[0] = 1$   
 $\#[1] = 2$   
 $\#[2] = 4$




B




$\#[0] = 1$   
 $\#[1] = 2$   
 $\#[2] = 5$

C

$\#[0] = 1$   
 $\#[1] = 3$   
 $\#[2] = 4$

D





Hay  $6 + 3 + 6 + 3 + 4 = 22$  relaciones de equivalencia con esas condiciones

**Ejercicio 10.** Probar que si  $R$  es una relación en  $A$  que es simétrica y transitiva, tal que para todo  $a$  en  $A$  existe algún elemento  $b$  en  $A$  tal que  $aRb$ , entonces  $R$  es una relación de equivalencia en  $A$ .

Solo nos falta ver que  $aRa \quad \forall a \in A$ .

Sea  $a \in A$ ,  $\exists b \in A \mid aRb$ , por simetria  $bRa$   
 y por transitividad  $aRb \wedge bRa \Rightarrow aRa$  ■